



ADUBO AZOTADO

AMAFLORES SULFATO DE AMÓNIO

ADUBO CE

Composição

Azoto total (N): 21%

Azoto amoniacal (NH₄): 21%

Enxofre total (S): 24 %

Trióxido de enxofre (SO₃): 60%

Solúvel em água

Recomendações de uso:

Adubo indicado para utilização em fundo ou cobertura.

O Sulfato de Amónio é especialmente indicado para a aplicação em:

- solos alcalinos e para culturas que preferem uma certa acidez.
- solos com carências em enxofre.

Dado que o azoto presente no Sulfato de Amónio se encontra exclusivamente sob a forma amoniacal, a sua acção é mais lenta e prolongada do que nos adubos que contêm azoto sob a forma nítrica. O Sulfato de Amónio apresenta acidez fisiológica elevada.

Cultura	Adubação de fundo (g/m ²)	Adubação de cobertura (g/m ²)
Batata	25 - 50	15 - 30
Citrinos	15 - 30	-
Fruteiras	15 - 25	30 - 50
(pomoideas e prunóideas)	10 - 25	-
Hortícolas	20 - 40	-
-ar livre	25 - 40	-
-estufa	25 - 35	-
	25 - 35	-

Peso líquido: 5 kg

Distribuído por:

Liscampo, Lda

Travessa do Carvalho, 31-35

1200-097 Lisboa PORTUGAL

Tlf. + 351 21 347 12 71

Fax. + 351 21 347 81 70

www.liscampo.com